



Novedades en Población

REVISTA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE POBLACIÓN

Año 4 Número 8, 2008

ISSN: 1817- 4078

<http://www.cedem.uh.cu/Revista/portada.html>

Tabla de mortalidad fetal según el peso al momento de la expulsión: una propuesta alternativa al modelo clásico

Dr. Luis Armando Martínez Barreiro
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas Granma
Dr. Lorenzo Herrera León
Centro de Estudios Demográficos (CEDEM)
Universidad de La Habana
Email: lorenzo@cedem.uh.cu

Resumen:

El propósito es diseñar tablas de mortalidad fetal según peso al momento de la expulsión del producto de la concepción, cuyo universo de estudio estuvo comprendido por todos los embarazos expulsados durante el período 1998-2002, con 22 ó más semanas de gestación, en la nación. La información utilizada proviene de las bases de datos de defunciones perinatales y nacidos vivos, provenientes de la Dirección Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba (DNE) y de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), respectivamente.

Por tratarse de una situación en la cual la temporalidad que exige la tabla de mortalidad no es unívoca en el sentido de la correspondencia peso- edad gestacional, se establecieron dos supuestos básicos: continuidad de la variable peso, lo cual no deja dudas, y condición estrictamente creciente, elemento este que de asumirse condiciones fisiológicas y clínicas favorables durante el embarazo, es aceptable.

Los resultados de esta aplicación formal de la técnica de la tabla de mortalidad, abren una nueva perspectiva para la estimación del riesgo de muerte fetal en función del peso y en general, de variables para las cuales pueda asumirse sin demasiados riesgos, que el desarrollo fetal, bajo condiciones normales, sigue una trayectoria creciente.

Con este estudio fue posible constatar algunas equivalencias entre la edad gestacional y el peso al momento de la expulsión, en cuanto a la sobrevivencia del feto en útero y por añadidura, establecer una alternativa al uso de la técnica de construcción de tablas de mortalidad en la forma tradicional o clásica.

Palabras clave: tabla de mortalidad; peso al momento de la expulsión; permanencia o sobrevivencia fetal.

Introducción:

La técnica de la tabla de mortalidad o de vida, se basa esencialmente en el manejo de eventos que dependen del tiempo. El ejemplo más clásico es el de la mortalidad: una persona nace y vive cierto tiempo y después muere. El tiempo de vida no es igual para todos los individuos por lo que tiene cierto carácter aleatorio.

Esta técnica, surgida primordialmente para el análisis de la mortalidad, fue usada para estudiar otros eventos como la morbilidad, la fecundidad, en estudios clínicos para medir sobrevivencia a ciertos tratamientos de enfermedades como el cáncer. En general fue aplicada a estudios en los que el evento de interés es de tipo no repetible, es decir, que acontece solamente una vez al individuo (referencia 1).

En este quehacer, también se han diseñado tablas de mortalidad para examinar la mortalidad intrauterina en función de la edad gestacional y más recientemente en Cuba, se han hecho indagaciones sobre la sobrevivencia del feto en útero en relación también al tiempo de gestación (2 y 3).

En el presente trabajo se pretende construir tablas de mortalidad fetal (a partir de la vigésima segunda semana de gestación) pero con una nueva perspectiva: el uso del peso

al momento de la expulsión del producto de la concepción como variable explicativa; en lugar del tiempo de gestación.

Esta tentativa permitirá realizar estimaciones de las probabilidades de muerte, según el peso del producto de la concepción, al igual que de otras funciones importantes de la tabla de mortalidad como la sobrevivencia o permanencia, y realizar comparaciones con las estimaciones obtenidas de tablas de mortalidad usando la edad gestacional.

Material y métodos:

En el presente trabajo se han construido cohortes de embarazos a partir de la vigésima segunda semana de gestación (comienzo del período fetal) en función del peso al momento de la expulsión del producto de la concepción.

El supuesto básico subyacente, tomado como premisa fundamental se relaciona con el hecho de que desde la formación embrionaria hasta la salida del producto de la concepción, el peso es una magnitud continua y creciente, es decir, el producto de la concepción transita desde un peso aproximado de 2 gramos en la creación embrionaria hasta el valor con que sale del vientre materno. Se descarta la posibilidad de una disminución del mismo siempre y cuando estén dadas las condiciones óptimas desde el punto de vista clínico y fisiológico durante el embarazo (4,5 y 6).

“Lo ideal en el embarazo es aumentar entre 9 y 15 kilos de peso en los nueve meses de gestación cuando se comienza con un peso normal. Si se comienza con un peso inferior al ideal, lo más probable es que se aumenten unos kilos extras, y si se comienza con exceso de peso sería óptimo no aumentar más de 6 a 9 kilos. El aumento de peso no es parejo durante los nueve meses, por lo general en el primer trimestre no se aumenta o incluso puede bajarse de peso debido al malestar habitual de este período. Es durante el segundo trimestre y más aún durante el último trimestre cuando hay un aumento de peso considerable, que es cuando el bebé realmente crece”.⁽⁷⁾

Existen fetos con peso que son superiores al esperado para su edad gestacional y en otros ocurre lo contrario, su peso es deficitario para un tiempo de gestación elevado. Esto implica que la relación peso-edad gestacional no es perfectamente lineal sino que presenta cierta dispersión alrededor de valores que podrían denominarse esperados (8, 9 y 10).

Para la construcción de la cohorte de embarazos según el peso se procedió de manera recurrente acorde a la metodología aplicada por Leridon, y posteriormente adaptada por Herrera para el caso de registros vitales, pero ahora considerando el peso en vez de la edad gestacional (2,3).

Los embarazos a inicio del intervalo de peso al momento de la expulsión (p , $p+1$), E_p se obtienen a partir de la relación recurrente

$$E_p = E_{p+1} + D_p + B_p$$

donde por D_p y B_p se denotan las salidas de fetos muertos y nacidos vivos con pesos entre p y $p+1$ gramos y por E_{p+1} , los embarazos al inicio del intervalo ($p+1$, $p+2$)

- A los intervalos de la forma $(p, p+1)$ se le ha atribuido una amplitud de 500 gramos.
- La relación anterior se utiliza hasta llegar al intervalo menor de peso observado, a decir, $(0, 500)$.
- Se supone que un feto expulsado con determinado peso, por ejemplo 3000 gramos, ha tenido necesariamente que transitar por todos los valores de peso menores a esa cifra y que además, puede haber estancamiento en la ganancia de peso (el feto puede permanecer algún tiempo sin experimentar incrementos). El caso extremo en el cual se admite que el feto puede experimentar un retroceso en el peso sería contrario a la filosofía de una tabla de vida, la cual supone que la variable independiente- el tiempo- es estrictamente creciente; en el caso que nos ocupa, el peso desempeña el lugar del tiempo. En qué sentido y magnitud puede afectar las estimaciones el no cumplimiento de ese postulado es algo de importancia crucial. Si tal es el caso, la probabilidad condicional de muerte en el intervalo $(p, p+1)$ para el cual el feto alcanzó su máximo valor del peso estaría subestimada y por el contrario, dicha probabilidad estaría sobrestimada en un intervalo anterior $(p', p'+1)$ en el cual ocurrió la expulsión del producto de la concepción, de suerte que la sobrevivencia acumulada no se vería afectada a causa de un efecto compensatorio.
- La tabla de mortalidad construida supone que el único riesgo al que está sometido cualquier embarazo es la expulsión de un feto como nacido muerto, por lo que aquellos que nacieron vivos, ahora entran en riesgo de muerte fetal (riesgo en competencia).
- El riesgo de mortalidad fetal en el intervalo $(p, p+1)$ se obtiene mediante la expresión

$$\gamma_p = D_p / (E_p - 0.5 D_p)$$


- El universo de estudio corresponde a las defunciones del período fetal (a partir de la vigésima segunda semana de gestación) y los nacidos vivos ocurridos en toda la nación en el período 1998-2002, también a partir de la 22 semana de gestación. En total, para el período analizado, se cuenta con 722 239 nacidos vivos y 10 695 defunciones fetales.
- La información anterior está contenida en las bases de datos de mortalidad perinatal y nacidos vivos, procedentes de la Dirección Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública de Cuba (DNE) y de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), respectivamente.
- Las fuentes de gráficos y cuadros son el resultado de la elaboración propia realizada por los autores con el paquete estadístico SPSS v.13 y MS Excel.

Desarrollo:

El peso al momento de la expulsión puede decirse que guarda una relación aproximadamente lineal creciente con la edad gestacional, aunque la misma presenta un grado de dispersión que en ocasiones distorsiona un poco la relación. El gráfico 1 muestra el diagrama de dispersión de esta relación para las defunciones fetales y los nacidos vivos. Se observa que para las primeras la relación está mejor delineada que para los nacidos vivos, con una pendiente positiva mayor, que se dibuja a pesar de la dispersión que presenta la nube de puntos.

Gráfico 1

Relación peso-edad gestacional, según resultado del embarazo. Cuba, 1998-2002.



El propio gráfico confirma que a pesar de incrementarse el peso a medida que el tiempo de gestación aumenta, la dispersión se incrementa; dando lugar a la existencia de fetos con edades gestacionales bajas que presentan pesos elevados y otros con edades gestacionales elevadas, (por ejemplo, 40 ó más semanas de gestación), cuyos pesos no superan los 1500 gramos). Este hecho hace que a través de la relación descrita no sea posible determinar unívocamente el peso del feto en función del tiempo de embarazo.

Como consecuencia de lo comentado, las tablas de mortalidad construidas utilizando como variable explicativa el peso, deben interpretarse con la debida precaución, pues persiste la tendencia de vincular el peso y la edad gestacional en su interpretación.

El cuadro 1(A, B) exhibe las funciones más importantes utilizadas convencionalmente en las tablas de vida. Los datos corresponden a la cohorte quinquenal de embarazos del período 1998-2002. En la primera columna se inscriben los intervalos, ya se trate del peso o de la edad gestacional; en la segunda están los embarazos a inicio de cada uno de ellos. La tercera columna contiene los embarazos censurados, es decir, aquellos que terminaron en nacidos vivos. A continuación aparecen solo los embarazos que estarán expuestos al riesgo de mortalidad fetal, como resultado de deducir de aquellos al inicio de cada intervalo la mitad de los nacidos vivos (se supone que estos estarán medio intervalo expuestos al riesgo de mortalidad).

La quinta columna contiene a las defunciones observadas y de ahí en adelante aparecen las probabilidades condicionales de muerte y su complemento, las de sobrevivencia, en cada intervalo. Finalmente las probabilidades acumuladas de sobrevivencia o permanencia, que describen la medida en que la cohorte va menguando sus efectivos a través del tránsito por la edad gestacional o por distintas categorías de peso.

Cuadro 1 A

Tabla de vida de embarazos según edad gestacional. Cuba, 1998-2002.

Duración (Semanas completas) (x, x+1)	Embarazos al inicio del intervalo	Número de salidas como nacidos vivos	Embarazos expuestos al riesgo de mortalidad	Número de embarazos que terminan en defunción	Probabilidad de muerte fetal en el intervalo	Probabilidad de sobrevivir el intervalo	Función de permanencia
22	730307	31	730291.5	158	0.000216	0.999784	0.999784
23	730118	24	730106	279	0.000382	0.999618	0.999402
24	729815	40	729795	433	0.000593	0.999407	0.998809
25	729342	49	729317.5	523	0.000717	0.999283	0.998092
26	728770	87	728726.5	776	0.001065	0.998935	0.997030
27	727907	194	727810	777	0.001068	0.998932	0.995965
28	726936	454	726709	603	0.000830	0.999170	0.995139
29	725879	680	725539	504	0.000695	0.999305	0.994447
30	724695	1339	724025.5	469	0.000648	0.999352	0.993803
31	722887	1997	721888.5	436	0.000604	0.999396	0.993203
32	720454	2687	719110.5	488	0.000679	0.999321	0.992529
33	717279	2789	715884.5	414	0.000578	0.999422	0.991955
34	714076	5395	711378.5	489	0.000687	0.999313	0.991273
35	708192	7705	704339.5	403	0.000572	0.999428	0.990706
36	700084	15559	692304.5	480	0.000693	0.999307	0.990019
37	684045	37195	665447.5	518	0.000778	0.999222	0.989248
38	646332	84605	604029.5	599	0.000992	0.999008	0.988267
39	561128	172701	474777.5	646	0.001361	0.998639	0.986923
40	387781	197791	288885.5	761	0.002634	0.997366	0.984323
41	189229	124762	126848	603	0.004754	0.995246	0.979644
42	63864	58114	34807	293	0.008418	0.991582	0.971397
43	5457	5123	2895.5	30	0.010361	0.989639	0.961333
Mediana	44						

Cuadro 1B

Tabla de mortalidad fetal según peso al momento de la expulsión. Cuba, 1998-2002.


Intervalo de peso (p, p+1)	Embarazos al inicio del intervalo	Número de salidas como nacidos vivos	Embarazos expuestos al riesgo de mortalidad	Número de embarazos que terminan en defunción	Probabilidad de muerte fetal en el intervalo	Probabilidad de sobrevivir el intervalo	Función de permanencia
0	731441	1	731440.5	202	0.000276	0.999724	0.999724
500	731238	243	731116.5	3698	0.005058	0.994942	0.994667
1000	727297	2917	725838.5	1513	0.002084	0.997916	0.992594
1500	722867	8292	718721	1192	0.001659	0.998341	0.990948
2000	713383	34913	695926.5	1106	0.001589	0.998411	0.989373
2500	677364	153145	600791.5	1187	0.001976	0.998024	0.987418
3000	523032	298870	373597	1039	0.002781	0.997219	0.984672
3500	223123	177461	134392.5	535	0.003981	0.996019	0.980752
4000	45127	39234	25510	164	0.006429	0.993571	0.974447
4500	5729	4924	3267	35	0.010713	0.989287	0.964008
5000	770	497	521.5	15	0.028763	0.971237	0.936280
5500	258	85	215.5	4	0.018561	0.981439	0.918901
Mediana	6000						

Alternativamente, se muestran en los gráficos 2 y 3 estas funciones, que por añadidura presentan algunas similitudes. Los riesgos de expulsión de muerte fetal presentan un máximo relativo entre las duraciones 26-27 semanas de gestación, luego descienden ligeramente para hacerse crecientes, de forma aproximadamente exponencial a partir de las 37 semanas de gestación. Este comportamiento ha sido descrito por varios autores,

coincidiendo con lo planteado aquí. Por su parte, las probabilidades según peso son en cierto sentido un eco de lo que sucede con la edad gestacional: un máximo relativo alrededor de los 500 gramos, un descenso y luego, desde los 3000 gramos en adelante, la curva supera sus valores anteriores con un crecimiento exponencial (11).

Gráfico 2

Probabilidades de muerte según edad gestacional y peso. Cuba, 1998-2002.




Las curvas de supervivencia fetal, merecen algunos comentarios previos antes de realizar un análisis más profundo. En primer lugar un valor cualquiera de esta función representa la proporción de embarazos que aún continúan en curso (es decir, no han sido expulsados del vientre materno) para una edad gestacional o categoría de peso dados. Es en el caso de la parte izquierda del gráfico 3, para la edad gestacional, y en el caso de la parte derecha del propio gráfico para un peso dado. Para la gráfica de la edad gestacional, las expulsiones siguen el orden cronológico señalado por el eje horizontal, a la vez que el peso de los fetos expulsados puede variar según se mostró en la parte izquierda del gráfico 1. El orden reflejado en el eje horizontal del peso, por el contrario, no implica necesariamente un orden cronológico en las salidas de los fetos, ya que, retomando un comentario precedente, existen embarazos en los cuales el producto de la concepción es de peso alto para la edad gestacional y viceversa. Es importante resaltar que ese eje del peso, implica una obligatoriedad en cuanto al crecimiento fetal en el sentido de que si un feto tiene determinado peso, necesariamente tuvo que transitar por todos los anteriores a ese valor.

Hay que añadir, la existencia de cierta equivalencia entre las dos curvas de permanencia fetal. A modo de ejemplo, puede observarse que para la semana 37, en la curva de permanencia según tiempo gestacional, aún queda el 99 % de la cantidad original de embarazos en curso, valor de supervivencia que es alcanzado cuando los embarazos llegan a los 2000 gramos de peso. También para una duración del embarazo de 41 semanas, en la cual todavía se conserva el 98 % de los efectivos de la cohorte, se tiene el mismo valor para un peso de 3500 gramos.

Gráfico 3

Función de sobrevivencia fetal según edad gestacional y peso. Cuba, 1998-2002.



De la observación de una u otra curva, se constata que, muchas de las expulsiones de fetos muertos están ocurriendo en edades gestacionales y pesos propicios para el nacido vivo. Aún más, la merma de la cohorte de embarazos en ambos casos, es más acelerada en edades gestacionales y pesos posteriores a las 37 semanas (duración para la cual se supone un feto a término) y a 2000 gramos, respectivamente.

Consideraciones finales:

La construcción de tablas de mortalidad con una variable que no es estrictamente temporal como el peso al momento de la expulsión del producto de la concepción, entraña algunas particularidades. En primer lugar, debe valorarse el supuesto básico sobre el cual reposa su diseño: el peso del feto en útero es siempre una magnitud continua y creciente. La continuidad es dada como un hecho irrefutable, mientras que el carácter creciente de esa magnitud, dependerá de las condiciones en las que transcurre el embarazo. No obstante, en las revisiones bibliográficas y consultas realizadas al respecto, no queda refutada con claridad esta cuestión.

En segundo lugar, por lo general es difícil desligar la relación temporal, en el sentido que se tiende a pensar que las expulsiones de fetos para un determinado valor de peso se corresponden unívocamente con una duración de la gestación dada. Si la relación peso-edad gestacional fuera perfectamente lineal, no habría lugar a dudas al asumir tal modo de encarar el asunto, pero recuérdese que existe una dispersión del peso alrededor de un valor que podría denominarse esperado o promedio, la cual presenta una expansión al incrementarse la duración del embarazo.

Del mismo modo, ocurre con las expulsiones del producto de la concepción según las semanas de la gestación. Si bien todas están obligadas a seguir un curso cronológico estricto, no todas presentan el mismo valor del peso al momento de la expulsión o parto.

La utilidad de esta propuesta metodológica radica en la posibilidad de ser un instrumento alternativo para realizar estimaciones del riesgo de mortalidad fetal en función del peso,

de manera continua. Hasta el presente, el modo más común de llevarlas a cabo consiste en el cálculo de tasas y probabilidades por categorías, que en ocasiones se apoyan en el uso de modelos multivariados de regresión. El uso reiterado acompañado de una crítica oportuna decidirá su pertinencia.

Bibliografía:

Ortega, A. *Tablas de Mortalidad. Centro Latinoamericano de Demografía* (CELADE). Serie E, No. 1004. San José, Costa Rica, 1987.

Leridon, H. *Aspectos biométricos de la fecundidad humana*. Serie D. No. 1031. Celade, San José. Costa Rica, 1977.

Herrera, L. *Patrón y nivel de la sobrevivencia fetal. Cuba, 1998-2002*. Trabajo realizado para optar por el título de Doctor en Ciencia Económicas. Centro de Estudios Demográficos. Universidad de La Habana. 2005

Rigol, O. *Obstetricia y ginecología*. Editorial Ciencias Médicas; La Habana, Cuba. 2005.

Sadler; TLangman. *Embriología médica con orientación clínica*. Editorial Ciencias médicas, 8va edición. La Habana, Cuba. .2005

¿Cuál es el peso que debería tener el final del embarazo?. Disponible en: <http://salud.infoplena.com/embarazo/aumento-normal-de-peso-durante-el-embarazo>. (Bajado 21 de enero, 2008)

Embarazo semana a semana, lo que hay que saber: guía para las madres. Disponible en: <http://www.abcpedia.com/embarazo/embarazo-semana-a-semana.htm>. (Bajado 21 enero/2008)

Solís P, Pullum SG, Frisbie W P. *Demographic Models of Birth Outcomes and Infant Mortality: An Alternative Measurement Approach*. *Demography* 2000; 37: 489-498.

Lagos, R et al.). *Índice neonatal en recién nacidos adecuado a la edad gestacional*. XXVII Congreso chileno en Obstetricia y ginecología. Disponible en: <http://www.med.ufro.cl/obgin/Fronteras/vol1num1/articulos/indicepon.pdf>. 1997 (21 enero/2008).

Grandi, C. *Relación entre la antropometría materna y la ganancia de peso gestacional con el peso de nacimiento, y riesgo de peso bajo al nacer pequeño para la edad gestacional y prematuridad en una población de Buenos Aires*. *Archivos Latinoamericanos de nutrición*. Vol, 53, N 4, Serie en Internet 2003. Disponible en: <http://www.alanrevista.org/ediciones/2003->. (21 de enero, 2008).

Yudkin; P. L. *Risk of unexplained stillbirth at different gestational ages*. *Lancet*, 1 (8543): 1192.