

El redescubrimiento de *Philodendron clementis* Wright ex Grisebach en Cuba.

Ileana Arias Granda
 Jardín Botánico Nacional
 Universidad de La Habana.

RESUMEN

Se reporta para Cuba el redescubrimiento de *Philodendron clementis* Wright ex Grisebach luego de 61 años sin colectarlo. Se ofrecen datos de distribución y características morfológicas de esta especie.

ABSTRACT

The rediscovery of *Philodendron clementis* Wright ex Grisebach after 61 years is reported from Cuba. Data about the distribution and morphological features of this species are given.

De las especies del género *Philodendron* Schott en nuestra Flora, resulta un tanto difícil hablar de *Philodendron clementis* Wright ex Grisebach, una especie interesante, cuyo areal de distribución está muy restringido en Cuba, además de constituir un elemento no abundante en la localidad donde se reporta.

En el herbario del Instituto de Ecología y Sistemática de la Academia de Ciencias de Cuba, se encuentran depositados dos ejemplares de la especie, incluyendo el de Charles Wright en la finca "El Retiro", provincia de Pinar del Río, donde se colectó originalmente la planta para su descripción el pasado siglo. No es hasta diciembre de 1927, en que el ingeniero Julián Acuña redescubrió la especie en la localidad de: Rangel, cuabalito "La Sambumbia", colina próxima.

En febrero de 1988, un grupo de trabajadores del Orquideario de Soroa, en un recorrido por las cabezadas del Río Taco-Taco en Rangel, colectaron un ejemplar de *Philodendron clementis* que se hallaba sobre un helecho arborescente, constituyendo este un valioso hallazgo, ya que considerábamos que esta especie había desaparecido de la flora cubana, pues búsquedas anteriores resultaron infructuosas.

Actualmente esta planta se exhibe en los pabellones de exposición del Jardín Botánico Nacional, donde recibe los cuidados requeridos para su desarrollo, manteniéndose en muy buen estado, como parte de los objetivos conservacionistas de los Jardines Botánicos en la actualidad.

La planta recientemente colectada coincide con la descripción original de Grisebach (1866) y con la que León (1946) ofrece en su primer volumen de la obra de la Flora de Cuba en cuanto a los caracteres vegetativos, ya que hasta el momento la planta no ha florecido, pero sin lugar a dudas se evidencia que:

Es una planta trepadora, con hojas ovado-cordiformes, de 38 cm de largo y 30 cm de ancho, ápice redondeado deltoideo, lóbulos basales semiorbiculares, seno abierto, nervios principales de los lóbulos basales 4 de cada lado, los demás 6 ó poco menos.

Algunos especialistas opinan que *Philodendron clementis* constituye un sinónimo de *Philodendron fragrantissimum* (Hook.) G. Don, una especie distribuida por Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam, suroeste del Amazona y este de Brasil.

Hasta el momento no hemos verificado el grado de relación entre ambas especies, no obstante, es de gran valor el hallazgo, pues constituye un elemento en peligro de extinción en nuestra flora.

BIBLIOGRAFIA

- Grisebach, A.H.R. (1866).
 Catalogus plantarum cubensium p. 220.
- León, Hno. (1946).
 Flora de Cuba. I. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio. "De la Salle" 8.

Recibido: 2 de agosto de 1989



Figura 1. *Philodendron clementis* Wright ex Grisebach.




Figura 2. Localidad donde se presenta *Philodendron clementis* Wright ex Grisebach.