



## Nuevos reportes para la Flora de Cuba: *Masadenus polyanthus* y *Oeceoclades maculata* (Orchidaceae)\*

Juan A. Hernández y Antonio R. Pérez  
Dirección Nacional de Flora y Fauna  
Marta A. Díaz, Jardín Botánico Nacional

### RESUMEN

*Masadenus polyanthus* (RCHB. f) SCHLTR. y *Oeceoclades maculata* (LINDL.) LINDL. son reportadas para Cuba.

### ABSTRACT

*Masadenus polyanthus* (RCHB. f) SCHLTR. y *Oeceoclades maculata* (LINDL.) LINDL. are reported from Cuba.

En exploraciones realizadas a la cayería situada al norte de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila en el año 1984 se encontraron dos interesantes orquídeas terrestres identificadas como *Masadenus polyanthus* (RCHB. f.) SCHLTR. y *Oeceoclades maculata* (LINDL.) LINDL.

*Masadenus polyanthus* se encontró viviendo en el sotobosque de un monte semideciduo micrófilo en cayo Guajaba (provincia Camagüey), creciendo sobre la hojarasca. En 1985 esta especie fue colectada por los compañeros del Instituto Superior Pedagógico de Camagüey en un lugar conocido como la Sierrecita en la costa norte de la provincia de Camagüey. La especie fue reportada originalmente de México y posteriormente de Guatemala, Florida, Bahamas, Puerto Rico y República Dominicana (Correll, 1950, 1982; Liogier, 1976; Luer, 1972).

---

\* Este trabajo fue presentado en el I Taller Científico de Orquídeas, Orquideario de Soroa, Pinar del Río, noviembre 1985

*Oeceoclades maculata* fue reportada originalmente de Brasil y con posterioridad se encontró en América del Sur desde Venezuela hasta Paraguay, América Central, Antillas, Bahamas y la Florida (Correll, 1982; Dunsterville and Garay 1959; Foldats, 1970). En Cuba no había sido colectada esta planta aunque aparece en el Catálogo preliminar de Orquídeas cubanas (Dietrich, 1984), quizás por alguna observación, pero sin constancia en herbario o colección. Fueron colectados varios ejemplares de esta especie en Cayo Coco, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, creciendo en condiciones similares a *Masadenus polyanthus*. Hasta el momento esta es la única localidad conocida aunque conocemos de su extensión paulatina en la Española, (Dod, 1986).

#### EJEMPLARES REVISADOS:

*Masadenus polyanthus*.

J.A. Hernández y A.R. Pérez 32625 Camagüey, Cayo Guajaba. Marzo/1984 (HAC).

E. Méndez 1758. Camagüey, La Sierrecita, cerca de Bahía "Las Nuevas". Septiembre 25/1985 (Herbario del Instituto Superior Pedagógico "José Martí", Camagüey).

*Oeceoclades maculata*:

J.R. Cuevas 32622. Ciego de Ávila, Cayo Coco. Septiembre/1984. (HAC).

#### BIBLIOGRAFÍA

Correll, D.S. (1950)

Native orchids of North America, north of México. Chronica Botanica. Massachusetts.

Correll, D.S. and H.B. Correll (1982)

Flora of the Bahama Archipelago, Vaduz.

Dietrich, H. (1984)

Vorläufiges Gattungs- und Artenverzeichnis cubanischer Orchidaceae. Wiss. Ztsch. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Naturwiss. 33: 707-721.

Dod, D. (1986)

*Oeceoclades maculata* (Orchidaceae), 1975 a 1985, en una marcha inexorable cruza la isla Española. Moscosoa 4: 203-205.

Dunsterville, G.C.K. and L.A. Garay (1959)

Venezuelan orchids illustrated 1. London.

Foldats, E. (1970)

Flora de Venezuela 15 (3). Caracas.

Garay, L.A. (1982)

A generic revision of the spiranthinae. Bot. Mus. Leaf. 28: 227-425.

Liogier, A.H. (1976)

Novitates Antillanae 7. Plantas Nuevas de la Española. Moscosoa 1 (1):  
16-49.

Luer, C.A. (1972)

The native orchids of Florida. New York.

Recibido: 30 de junio de 1987.